

**QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL SUPERIOR**

As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

## **HIV: vitórias para uns, sentença de morte para outros**

Florence Anam

Foi instituído, no dia 1º de dezembro, há 30 anos, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, uma data observada desde os anos 80, quando o diagnóstico do HIV era uma sentença de morte e os antirretrovirais que salvam vidas eram um sonho distante. A reflexão que farei a seguir é compartilhada pelas equipes de saúde nos projetos de HIV e tuberculose da organização Médicos Sem Fronteira na África Subsaariana, em partes da Ásia e na Europa Oriental, vislumbrando um futuro incerto.

O mundo se acostumou a notícias que apresentavam a resposta ao HIV como um sucesso. Certamente, em alguns lugares, particularmente no norte global, não há como comparar a situação de hoje com 30 anos atrás. Mas, se os últimos 20 anos forem conhecidos como a "revolução do tratamento do HIV" com seus enormes avanços no acesso a fármacos e ferramentas de prevenção graças ao vigoroso financiamento internacional, do nosso ponto de vista, temos entrar na era do "retorno da AIDS". A impressão geral pode ser que o pior já passou, mas isso não é verdade.

Este ano, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS) relata que 75% dos 36,9 milhões de pessoas que vivem com o HIV sabem da sua condição, em comparação com apenas dois terços (67%) em 2015, e 59% das pessoas têm acesso ao tratamento. No entanto, um lado terrível dessa narrativa positiva de sucesso está surgindo. O progresso global acerca do HIV permanece grosseiramente desigual. Existem também indícios preocupantes de que os doadores de recursos financeiros internacionais estão agora desvinculando-se da luta contra o HIV.

Quase 1.000.000 de pessoas que vivem com o HIV morreram de AIDS em 2017, apesar da ciência, ferramentas e diagnósticos disponíveis. O número global de mortes pelas consequências da infecção do vírus mal diminuiu nos últimos anos. A meta global de 150 mil mortes a menos por ano paira no horizonte como uma miragem. O número de mortes por Aids em países onde MSF trabalha continua a ser surpreendente: 17 mil mortes na República Democrática do Congo, 5,1 mil mortes na Guiné, 28 mil mortes no Quênia, 39 mil mortes no Maláui, 70 mil mortes em Moçambique e 126 mil mortes na África do Sul. Hoje, 30% a 40% das pessoas em todo o mundo que testam positivo para o HIV e iniciam o tratamento o fazem com uma contagem de CD4 alarmantemente baixa (abaixo de 200), um indicador de falha imunológica grave, e estão em risco de morte.

O que é diferente hoje em dia é que grande parte das pessoas que se apresentam nas piores fases da Aids já conhece o seu estado soropositivo, com a maioria já fazendo uso dos antirretrovirais. Nos hospitais apoiados por MSF que atendem pacientes com Aids, boa parte deles já estava em tratamento: Kinshasa (DRC) 71%, Conakry (Guiné) 62%, Homa Bay (Quênia) 60% e Nsanje (Maláui) 67% dos pacientes. Os desafios inevitáveis do tratamento diário, juntamente com os sistemas de saúde que lutam para apoiá-los adequadamente, levam a que as pessoas experimentem uma "falha no tratamento", quando interrompem o processo ou a terapêutica deixa de funcionar para eles. Na pior das hipóteses, uma proporção significativa desenvolveu resistência ao tratamento existente.

No entanto, sem o reconhecimento político de um número elevado e continuado de mortes por Aids, não veremos acontecerem ações práticas necessárias para as ajudar as pessoas que vivem com o HIV. Medidas para lidar efetivamente com a Aids "contemporânea" permanecem claramente ausentes da atual resposta ao vírus. Centros de saúde e hospitais devem ser equipados para fornecer testes rápidos e tratamento para pessoas em fases avançadas do HIV, e, uma vez recuperados, orientá-los de volta ao tratamento estável ao longo da vida, com um grupo de medicamentos de segunda e terceira linha quando necessário.

Ao mesmo tempo, observações de colegas de MSF e ativistas do HIV na África Subsaariana também indicam os primeiros sinais do impacto mortal de uma queda acentuada no financiamento internacional que afetará milhões de vidas nos próximos anos. Em países dependentes de doadores internacionais de recursos, especificamente dos antirretrovirais, um déficit de financiamento internacional para o combate ao HIV e uma redução do tratamento parecem iminentes no momento mais crucial. Enquanto os últimos 20 anos viram uma

geração de vidas salvas graças à solidariedade internacional, hoje uma nova geração corre o risco de ser perdida quando os doadores se desconectam da causa.

Sem recursos adicionais, países como a República Centro-Africana e a Guiné serão forçados a reduzir as taxas de iniciação (quando a pessoa inicia pela primeira vez o tratamento), em vez de acelerar urgentemente a ampliação necessária dos programas de HIV, ao mesmo tempo que enfrentam déficits de financiamento do Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária nas suas alocações de 2018-2020.

Muito tem sido dito recentemente sobre a importância do teste de HIV, mas ele não pode ser visto isoladamente do atual contexto de financiamento. Sem recursos para garantir o impulsionamento e apoio ao tratamento de pessoas com HIV, o conhecimento do estado soropositivo é um verdadeiro dilema. As pessoas que testam positivo para o vírus devem ter acesso ao tratamento, dentro dos sistemas de saúde ou postos comunitários com suporte para dar o atendimento. Sem compromisso político e financiamento contínuo, não haverá aumento de testes e tratamento - nem redução de mortes relacionadas à Aids.

O Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, celebrado neste mês, é sobre solidariedade internacional com pessoas que continuam a lutar pela sobrevivência, numa batalha contra barreiras de negligência e discriminação. Estas são as pessoas e pacientes que precisam da nossa atenção. O Dia Mundial de Luta Contra a Aids 2018 é sobre eles, aqueles que continuam a morrer na sombra do sucesso.

Disponível em: <<https://brasil.elpais.com/brasil>>. Acesso em: 17 dez. 2018.

**01.** O texto, de forma predominante,

- A) defende um ponto de vista acerca dos rumos tomados pelas políticas de combate à disseminação do vírus HIV.
- B) descreve a realidade de países onde as políticas de combate ao HIV não têm logrado muito sucesso.
- C) narra a trajetória da organização Médicos Sem Fronteira na execução de políticas de combate ao HIV em países pobres.
- D) expõe uma visão consensual acerca da gestão das políticas de combate à disseminação do vírus HIV em países pobres.

**02.** No terceiro parágrafo, há

- A) citação indireta, em que a informação da fonte citada é transcrita literalmente.
- B) citação direta, em que a informação da fonte citada é parafraseada.
- C) citação direta, em que a informação da fonte citada é transcrita literalmente.
- D) citação indireta, em que a informação da fonte citada é parafraseada.

**03.** Os parágrafos 5 e 6 estão interligados por elemento coesivo que assinala

- A) acréscimo de informação e estabelece uma relação de conclusão entre eles.
- B) retomada de informação e estabelece uma relação de explicação entre eles.
- C) acréscimo de informação e estabelece uma relação de contraposição entre eles.
- D) retomada de informação e estabelece uma relação de concessão entre eles.

04. No trecho a seguir

Sem recursos adicionais, países como a República **Centro-Africana** e a Guiné serão forçados a reduzir as taxas de iniciação [...]

Considerando-se as normatizações atuais da ortografia oficial da língua portuguesa, a palavra em destaque recebe hífen pela mesma orientação normativa de

- A) anti-inflamatório.
- B) médico-cirurgião.
- C) pós-graduação.
- D) João-de-barro.

05. Considere os trechos reproduzidos a seguir

(1) **Existem** também indícios preocupantes de que os doadores de recursos financeiros internacionais estão agora desvinculando-se da luta contra o HIV.

(2) Sem compromisso político e financiamento contínuo, não **haverá** aumento de testes e tratamento - nem redução de mortes relacionadas à Aids.

Mantendo-se a mesma estrutura dos trechos 1 e 2 e permutando-se as formas verbais em destaque, é correto afirmar, considerando-se a orientação gramatical normativa do português, que

- A) o verbo “existir” continuará flexionado no plural e o verbo “haver” permanecerá no singular.
- B) o verbo “existir” será flexionado no singular e o verbo “haver” permanecerá no singular.
- C) o verbo “existir” será flexionado no singular e o verbo “haver” será flexionado no plural.
- D) o verbo “existir” continuará flexionado no plural e o verbo “haver” será flexionado no plural.

06. Considerando-se as relações sintático-semânticas da língua portuguesa e a coerência da informação produzida, é possível a substituição da vírgula pelo ponto final em:

- A) Muito tem sido dito recentemente sobre a importância do teste de HIV, mas ele não pode ser visto isoladamente do atual contexto de financiamento.
- B) Enquanto os últimos 20 anos viram uma geração de vidas salvas graças à solidariedade internacional, hoje uma nova geração corre o risco de ser perdida quando os doadores se desconectam da causa.
- C) Sem recursos para garantir o impulsionamento e apoio ao tratamento de pessoas com HIV, o conhecimento do estado soropositivo é um verdadeiro dilema.
- D) Sem compromisso político e financiamento contínuo, não haverá aumento de testes e tratamento - nem redução de mortes relacionadas à Aids.

07. São gêneros textuais que apresentam a mesma sequência textual dominante no texto desta prova:

- A) o conto e a crônica.
- B) a resenha e a notícia.
- C) a carta aberta e o relatório de atividade acadêmica.
- D) o editorial e a carta argumentativa.

08. Há palavra em que o acento gráfico indica flexão de número em

- A) Em países dependentes de doadores internacionais de recursos, especificamente dos antirretrovirais, um déficit de financiamento internacional para o combate ao HIV e uma redução do tratamento parecem iminentes no momento mais crucial.
- B) No entanto, sem o reconhecimento político de um número elevado e continuado de mortes por Aids, não veremos acontecerem ações práticas necessárias para as ajudar as pessoas que vivem com o HIV.
- C) Foi instituído, no dia 1º de dezembro, há 30 anos, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, uma data observada desde os anos 80, quando o diagnóstico do HIV era uma sentença de morte e os antirretrovirais que salvam vidas eram um sonho distante.
- D) Este ano, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS) relata que 75% dos 36,9 milhões de pessoas que vivem com o HIV sabem da sua condição, em comparação com apenas dois terços (67%) em 2015, e 59% das pessoas têm acesso ao tratamento.

09. Considere o período

O mundo se acostumou a notícias que apresentavam a resposta ao HIV como um sucesso.

Esse período é composto por

- A) subordinação, em que a segunda oração exerce função adjetiva, de caráter restritivo, em relação à primeira.
- B) subordinação, em que a segunda oração exerce função adjetiva, de caráter explicativo, em relação à primeira.
- C) coordenação, em que a segunda oração exerce função adjetiva, de caráter restritivo, em relação à primeira.
- D) coordenação, em que a segunda oração exerce função adjetiva, de caráter explicativo, em relação à primeira.

10. No período

Hoje, 30% a 40% das pessoas em todo o mundo que testam positivo para o HIV e iniciam o tratamento o fazem com uma contagem de CD4 alarmantemente baixa (abaixo de 200), um indicador de falha imunológica grave, e estão em risco de morte.

O elemento linguístico em destaque

- A) acrescenta informação e assume posição de ênclise em relação ao verbo.
- B) retoma informação e assume posição de próclise em relação ao verbo.
- C) acrescenta informação e assume posição de próclise em relação ao verbo.
- D) retoma informação e assume posição de ênclise em relação ao verbo.

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÓGICA

11. Ao analisar a afirmação “Não é verdade que, se João mora em Caicó, então José mora em Cruzeta”, conclui-se que ela é logicamente equivalente à afirmação:
- A) “Não é verdade que João não mora em Caicó ou José não mora em Cruzeta”.
  - B) “É verdade que João mora em Caicó ou José mora em Cruzeta”.
  - C) “Não é verdade que João não mora em Caicó ou José mora em Cruzeta”.
  - D) “É verdade que João mora em Caicó e José mora em Cruzeta”.
12. Um candidato a um concurso organiza seu material para levar no dia da prova. Ele possui 13 canetas, sendo 7 azuis e 6 pretas. Se, por segurança, ele pretende levar seis canetas para o concurso, sendo duas pretas, o número de maneiras que ele pode selecionar essas canetas são
- A)  $A_{6,2} \cdot A_{7,4}$ .
  - B)  $C_{6,2} \cdot C_{10,4}$ .
  - C)  $A_{6,2} \cdot A_{10,4}$ .
  - D)  $C_{6,2} \cdot C_{7,4}$ .
13. Maria e Joana estão participando de uma competição em que a probabilidade de pelo menos uma delas ser vitoriosa é de 90%. Se a probabilidade de Maria vencer a competição é de 60%, a probabilidade de Joana ser a vitoriosa é de
- A) 65%.
  - B) 70%.
  - C) 75%.
  - D) 80%.
14. Suponha que as prefeituras das cidades XIS, IPSILON e ZÊ possuem um veículo cada uma, de modelos diferentes. Considere que os modelos de veículos que essas prefeituras possuem são: caminhonete, sedã ou *hatch* e que somente uma das afirmativas a seguir é verdadeira:

I	O veículo da prefeitura XIS é uma caminhonete.
II	O veículo da prefeitura IPSILON não é uma caminhonete.
III	O veículo da prefeitura ZÊ não é um sedã.

Sendo assim, os modelos dos veículos das prefeituras XIS, IPSILON e ZÊ são, respectivamente,

- A) sedã, *hatch* e caminhonete.
- B) sedã, caminhonete e *hatch*.
- C) *hatch*, sedã e caminhonete.
- D) *hatch*, caminhonete e sedã.

15. Os termos da sequência (7, 21, 43, 73,...) foram obtidos segundo uma lei de formação. De acordo com essa lei, o valor do 7º termo subtraído do 6º termo dessa sequência é igual a
- A) 46.
  - B) 38.
  - C) 54.
  - D) 62.

**QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA - ODONTÓLOGO**

16. A instância colegiada, de caráter permanente e deliberativo, composta por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, é
- A) o Conselho de Saúde.
  - B) a Conferência de Saúde.
  - C) a Regional de Saúde.
  - D) o Controle Social.

17. Constitui infração ética revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Sobre essa infração, afirma-se que, entre outros motivos de justa causa que isenta de penalidade o responsável pela ação, está a

I	colaboração com a justiça nos casos previstos em lei..
II	estrita defesa de interesse legítimo dos profissionais inscritos nos conselhos regionais.
III	revelação de fato sigiloso aos familiares, independentemente da idade do paciente.

Considerando as afirmações descritas acima,

- A) somente as afirmações I e III estão corretas.
  - B) somente as afirmações I e II estão corretas.
  - C) somente as afirmações II e III estão corretas.
  - D) todas as afirmações estão corretas.
18. Os profissionais da área de saúde, por estarem mais expostos, possuem um risco elevado de aquisição de doenças infecciosas, devendo estar devidamente imunizados. As vacinas mais importantes para os profissionais da Odontologia são
- A) as vacinas contra influenza e contra pneumococos.
  - B) as vacinas contra hepatite B, influenza, tríplice viral e dupla tipo adulto.
  - C) as vacinas contra hepatite C, influenza e tríplice viral.
  - D) as vacinas BCG-ID, dupla adulto e contra influenza.
19. Os anti-inflamatórios são amplamente utilizados na odontologia. Sobre esses fármacos, é correto afirmar:
- A) Os corticoides são um exemplo de anti-inflamatórios não-esteroides, indicados para o tratamento de doenças como a asma e as inflamatórias autoimunes.
  - B) Os AINEs (anti-inflamatórios não-esteroides) mais potentes inibem o crescimento bacteriano; por isso eles são importantes como agentes antimicrobianos.
  - C) Diferentemente dos AINEs (anti-inflamatórios não-esteroides), que são apenas sintomáticos, os anti-inflamatórios esteroides alteram a evolução da doença, levando à cura.
  - D) O Ibuprofeno é um anti-inflamatório não-esteróide, derivado do ácido propiônico com propriedades anti-inflamatória, analgésica e antitérmica e causa menos efeitos adversos que outros anti-inflamatórios não-esteroides.

20. Sobre as radiografias intrabucais, é correto afirmar:
- A) As técnicas radiográficas intrabucais são: periapical, interproximal, oclusal e panorâmica.
  - B) Na radiografia oclusal, duas técnicas básicas são empregadas: bisettriz e paralelismo, apresentando a última uma série de vantagens.
  - C) A radiografia interproximal é fundamental para pesquisa de cáries interproximais, evidenciação de alterações na câmara pulpar, crista alveolar e adaptações marginais de restaurações.
  - D) Na técnica do paralelismo, os raios devem incidir perpendicularmente ao plano bissetor formado entre o dente e o filme.
21. No exercício da clínica odontológica rotineira, o cirurgião-dentista se depara com as mais diversas situações. Diante disso, é correto afirmar:
- A) Os pacientes cardiopatas controlados podem utilizar a felipressina 0,03 UI/ml, como representante não adrenérgico, por apresentar, como principal vantagem, a menor repercussão sobre o sistema cardiovascular.
  - B) No caso clínico de atendimento de urgência a paciente com Diabetes *Mellitus* descompensado, os anestésicos indicados são Mepivacaína a 2% + epinefrina e Prilocaína sem vasoconstritor.
  - C) A mepivacaína deve ser o anestésico de escolha para pacientes grávidas e lactantes, devido à sua melhor metabolização pelo fígado do feto e de crianças recém-nascidas.
  - D) Os anestésicos locais sem vasoconstritor são os anestésicos de escolha para o uso na grande maioria dos procedimentos odontológicos de todos os tipos de pacientes, por apresentarem menor poder de toxicidade e produzirem uma anestesia pulpar de longa duração.
22. Paciente gestante, de 28 anos de idade, chega ao consultório odontológico do posto de saúde de seu bairro apresentando lesão vermelha pediculada, lobulada, localizada na papila gengival, entre os dentes 23 e 24. A lesão é indolor, de crescimento lento, tendo aparecido há aproximadamente quatro semanas. A paciente relata que o único desconforto é o sangramento, principalmente durante a escovação. O exame histopatológico revelou proliferação vascular semelhante ao tecido de granulação, com superfície ulcerada apresentando um exsudato fibrinoso e com infiltrado inflamatório misto.
- De acordo com o caso clínico relatado, corresponde ao diagnóstico da referida lesão:
- A) Hiperplasia papilar inflamatória.
  - B) Granuloma periférico de células gigante.
  - C) Hemangioma.
  - D) Granuloma piogênico.
23. Pacientes que foram submetidos a tratamento com radioterapia para tumores de cabeça e pescoço possuem contraindicação para a realização de exodontias devido ao risco de
- A) metástase.
  - B) hemorragia.
  - C) infecção generalizada.
  - D) osteorradionecrose.



24. Em relação ao tratamento e ao prognóstico de lesões traumáticas nos dentes anteriores decíduos, é correto afirmar
- A) o reimplante é contraindicado se ocorrer o deslocamento total de um dente decíduo de seu alvéolo.
  - B) o tratamento endodôntico radical e dentística restauradora são indicados na grande maioria dos casos de fratura complicada de coroa e raiz.
  - C) a pulpotomia e a dentística restauradora devem ser realizadas em fraturas confinadas exclusivamente ao esmalte.
  - D) no caso clínico de uma luxação intrusiva, em que o ápice do elemento dentário traumatizado estiver deslocado para dentro do germe do dente permanente, o tratamento mais indicado é a tração ortodôntica.
25. Em relação aos procedimentos de dentística restauradora utilizando-se as resinas compostas fotopolimerizáveis, é correto afirmar que
- A) as resinas híbridas não estão indicadas para restaurações de dentes posteriores por possuírem baixa resistência à tração.
  - B) as resinas de micropartículas são ideais para a restauração de dentes anteriores e posteriores, por possuírem um alto grau de polimento, proporcionando superfícies mais lisas e estética satisfatória.
  - C) as resinas nanoparticuladas possuem, como uma de suas propriedades, um alto grau de polimento e lisura superficial, sendo indicadas, dentre outras situações, para cavidades de classe V.
  - D) as resinas micro-híbridas são indicadas para a restauração de qualquer tipo de cavidade, exceto para as restaurações em dentes posteriores, por não possuírem adequada resistência à tração.
26. É uma técnica restauradora empregada em lesões dentinárias, que dispensa o uso de anestesia, isolamento absoluto e instrumentos rotatórios. Nela, apenas instrumentos manuais são utilizados para a remoção da maior parte do tecido alterado pela doença cárie. É uma abordagem de mínima intervenção que procura preservar o máximo de estrutura dentária e aumentar a probabilidade de maior cooperação obtida pelo paciente, reduzindo o tempo operatório, evitando as fobias relacionadas a punções, ruídos e vibrações e, conseqüentemente, gerando menor ansiedade. A técnica descrita denomina-se
- A) Capeamento pulpar direto.
  - B) Selamento provisório.
  - C) Tratamento Restaurador Atraumático.
  - D) Pulpotomia.
27. Das afirmativas elencadas abaixo, está correta:
- A) A erosão é uma lesão cervical não cariosa, resultante de forças oclusais excêntricas, que se propagam perpendicularmente ao longo eixo do dente.
  - B) A dimensão vertical de oclusão (DVO) é definida como a altura do perfil facial do paciente, medida por meio de dois pontos selecionados, um na maxila e outro na mandíbula, com os dentes em oclusão de Máxima Intercuspidação Habitual (MIH).
  - C) Tanto a arcada dentária superior quanto a inferior são formadas por uma série de catorze dentes e apresentam curvaturas idênticas quando observadas nos planos horizontal, frontal e sagital.
  - D) Na oclusão dentária normal, as incisais dos dentes anteriores da maxila devem tocar ligeiramente as incisais dos dentes anteriores da mandíbula, na posição de relação cêntrica.

28. Em relação às técnicas básicas de exodontia e suas complicações, é correto afirmar:
- A) A alveolectomia é uma técnica cirúrgica de exodontia via alveolar, podendo ser parcial ou total.
  - B) O extrator utilizado para exodontia pode ser: reto, angulado direito, angulado esquerdo, apical e serrilhado.
  - C) O fórceps de escolha para exodontia de incisivos, caninos e pré-molares inferiores é o de nº 151.
  - D) A alveolite é uma complicação pós-operatória que ocorre somente na extração dentária de pacientes diabéticos, devido à vascularização deficiente e dificuldades de cicatrização.
29. Os exames complementares fornecem informações necessárias para a realização do diagnóstico de uma determinada alteração ou doença. Em relação a esse assunto na prática odontológica, é correto afirmar que
- A) a sialografia é o exame hematológico das glândulas salivares maiores, usada para a avaliação funcional das glândulas parótidas e submandibulares com suspeita de anomalias como síndrome de Sjögren, sialoadenites crônicas e tumores.
  - B) a suspeita de que haja a presença de alterações significativas na hemostasia deve levar o profissional a solicitar os exames glicêmicos e de urina.
  - C) a biópsia deve sempre ser realizada quando houver áreas de necrose e lesões angiomasas, por serem lesões de prognóstico ruim.
  - D) a solicitação de um exame complementar deve levar em consideração os dados obtidos por meio da anamnese e do exame físico, sabendo exatamente o que se pretende obter e conhecendo corretamente o valor e as limitações do exame solicitado.
30. O fluoreto tem papel no controle compensatório dos ciclos de desmineralização e remineralização porque
- A) estimula os fenômenos de redeposição mineral.
  - B) diminui a resistência do esmalte ao desafio cariogênico.
  - C) aumenta a solubilidade do esmalte aos ácidos do biofilme dental.
  - D) reduz o acúmulo de bactérias sobre os dentes.